



# Traitement des plaies

**Les plaies ouvertes ou celles qui saignent abondamment doivent être désinfectées et pansées. Dans les pages qui suivent, il est montré comment s’y prendre. À ce sujet, consulter aussi « Premiers secours, en pratique » plaies béantes » à la rubrique « Premiers secours » sur le site web de l’Alliance.**

**D**ans *nous, samaritains* 11/2008, nous avons présenté la fabrication de compresses chez FLAWA AG, Flawil, un sponsor de l’Alliance des samaritains. Il y était notamment question de la compresse M.I.C., la seule au monde dont les bords sont

soudés aux ultrasons. Il existe des compresses de gaze ou en non-tissé, des compresses mixtes gaze et non-tissé, des compresses qui n’adhèrent pas à la plaie et des compresses spéciales qui contiennent des pommades, des gels, du charbon actif ou d’autres substan-

ces chimiques. Voici comment les utiliser en cas d’égratignure sur du gravier (A1–A8), en cas de blessure avec des restes d’herbe (B1–B5), en cas de coupure (C1–C8) et en cas de saignement du nez (D1–D2).

Tanya Bauer



**A1**

**Se laver les mains et enfiler des gants**



**A2**

**Laver la plaie, si possible avec de l’eau potable**



**A3**

**Sécher les abords de la plaie**



**A4**  
Désinfecter soigneusement la plaie



**A5**  
Poser une compresse M.I.C. stérile, non adhérente, sur la plaie



**A6**  
Fixer la compresse au moyen d'une bande de gaze



**A7**  
Attacher la bande au moyen d'un nœud plat sur la face extérieure du bras



**A8**  
La même blessure, mais la bande de gaze a été remplacée par une bande élastique adhésive (« Nova Press »)

**Observer la plaie**  
Si le saignement perdure ou si l'on observe des signes d'infection ou des troubles moteurs, consulter un médecin.



**B1**  
Blessure contenant des restes d'herbe



**B2**  
Laver la plaie, si possible avec de l'eau potable, puis la désinfecter



**B3**  
Sécher les abords de la plaie au moyen d'un tampon, puis désinfecter



**B4**  
Couvrir la plaie avec une compresse M.I.C.



**B5**  
Fixer la compresse

**Avant de se rendre chez le médecin :**

1. Enfiler des gants
2. Couvrir la plaie avec une compresse si possible stérile
3. Ne pas retirer les corps étrangers, évt. stabiliser



**C1**  
Coupure au doigt



**C2**  
Laver la plaie, si possible avec de l'eau potable



**C3**  
Sécher les abords de la plaie au moyen d'un tampon, puis désinfecter



**C4**  
Couvrir avec une compresse stérile, non adhérente, et fixer à l'aide d'« Urgens » (protection autocollante)



**C5**  
Mesurer la longueur sur le membre non lésé, la doubler, puis couper



**C6**  
Poser la protection



**C7**  
Presser les bords de la protection l'un contre l'autre



**C8**  
Couper les débords

**Le coton n'a rien à faire dans le traitement des plaies à l'exception du coton hémostatique en cas de saignement du nez**



**D1**  
Nettoyer soigneusement les restes de sang



**D2**  
Boucher la narine

**Disponible au Service des ventes de l'ASS**  
Ces pages peuvent être consultées à l'adresse [www.samaritains.ch](http://www.samaritains.ch) > Premiers secours, en pratique.  
Les compresses utilisées sont disponibles au service des ventes de l'ASS.